



فرزندتان را در برابر بیماری های عفونی

Dutch National Immunisation Programme

فرزندتان را واکسینه کنید

همهٔ کودکان در هلند چند واکسن علیه بیماریهای عفونی دریافت همه تود کا در نسته چنه و نسس میه بینه ریه ی حربی حربی می کنند. این کار واکسینه کردن یا واکسیناسیون نام دارد. با این کار فرزند شما را در برابر بیماری های جدی عفونی حفاظت می کنیم. کودکانی هم که در هلند به دنیا نیامده اما برای زندگی به اینجا آمده اند واکسینه خواهند شد. برنامهٔ واکسن هلند در این مورد اجرا خواهد شد. برنامه واکسن هلند در این مورد اجرا خواهد شد. برنامه واکسن کشور زادگاه شما با برنامه واکسن هلند مطابقت داده می شود. بر اساس آن نگاه می کنیم که چه نوع واکسنی می تواند ارائه بشود. این بستگی دارد به سن فرزند شما و واکسنی که دریافت کرده

پزشک در مورد واکسنی که فرزند شما باید دریافت کند تصمیم گیری خواهد کرد. اگر شما دفترچه واکسن از کشور زادگاهتان را دارید، به

در این کتابچه راهنما به شما اطلاعاتی در مورد واکسنهای گوناگون میدهیم. شما همچنین در آن میخوانید که آگر فرزند شما از واکسن دریافت کرده ناراحت باشد، چه میتوانید بکنید. این مهم است که برنامه واکسن به طور کامل اجرا شود. در این صورت فرزندتان بهترین ایمنی را در برابر بیماریهای عفونی خواهد داشت.

واکسن برای فرزندان شما رایگان است. دولت هلند هزینهٔ آن را پرداخت میکند.

فرزند شما در برابر چه بیماریهایی واکسن دریافت میکند؟ برخی از بیماریهای عفونی بسیار جدی هستند و مبارزه با آن مشکل است. به این خاطر عاقلانه است که فرزندتان را واکسینه کنید. فرزند شما در برابر آین بیماریها واکسن دریافت می کند:

- فلج اطفال
- سرحب. بیماری از باکتری هموفیلوس آنقلوآنزا بیماری پنومونیه (سینه پهلو) بیماری مننژیت نوع س
 - - سرطان دهانهٔ رحم (VPH)

آیا فرزند شما بیمار بوده و یا دارو مصرف می *کند؟*

آیا فرزند شما به بیماری سختی مبتلا بوده و یا دارو مصرف می کند؟ یا که فرزند شما در سه سال گذشته تحت درمان پزشک بوده است؟ آیا فکر مّی کنید که فرزند شما بیمار است؟ پیش آز واکسن زدن این را به پزشک یا پرستار بگوئید.

برنامه واكسيناسيون

کُودکانی که درِ هلند به دنیا میآیند بر اساس برنامه کشور هلند واکسینه خواهند شد. اگر فرزند شما در سن بالاتری وارد هلند شده باشد، شاید برخی از واکسن ها را در کشور خودتان دریافت کرده باشد. برنامه واکسیناسیون برای او تنظیم خواهد شد. پزشک به شما توضیح می دهد که فرزند شما چه واکسنهایی را لازم دارد. پزشک یا پرستار واکسن را تزریقَ می کند. برای سئوال یا اطلاعاتُ بیشتر می توانید به پرستار یا پزشک مراجعه کنید.

| *. | كسيناسيون | برنامه وآ | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | نوبت ۱ | ٣ | | | 14 | نوبت ۲ ۴ ساله | نوبت ۳ ۹ ساله | نوبت ۴ ۱۲ ساله |
| | دو ماهگی [PKTP] دیفتری، اسیاه سرفه، کزاز، | ماهگی [DKTP] دیفتری، سیاه سرفه، گزاز، فلج اطفال- | ماهگی [DKTP] دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال- | م هه [DKTP] دیفتری، سیاه سرفه، گزاز، فلج اطفال- | ماهه [BMR] واکسن سه گانه | DKTP] دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، | (DKTP] دیفتری، | (HPV] دیفتری، سرطان دهانه رحم |
| تزریق اول | فلج اطفال- أنفلوانزا- هپاتيت ب بنومونيه | ویج اصفان آنفلوآنزا- هپاتیت ب | فیج اطفان آنفلوآنزا- هپاتیت ب | تبع اطفان انفلوآنزا- هپاتیت ب پنومونیه | | فلج أطفال | كزاز، فلج اطفال | (۳ نوبت ۱ آمپول) |
| تزریق دوم | پنومونیه (سینه پهلو) | (سينه پهلو) | (سینه پهلو) | (سينه پهلو) | مننژیت نوع س | | [BMR] واکسن سه گانه | |
| * اعتبار از اول ماه اگوست ۱۱ ۵ دیفتری Hib هموفیلیوس آنفلوآنزا M سرخک ۸ سیاه سرفه HepB هیاتیت ب R سرخجه | | | | | | | | |
| | | ۲ سیه سریه سریه Pneu پنومونیه (سینه پهلو) P فلج اطفال B اوریون | | | | | | |

فرزند شما با دریافت واکسن در برابر چه بیماری حفاظت مي شود؟

دیفتری دیفتری یک التهاب عفونی سخت در گلو است. اگر فرزند شما به دیفتری مبتلا باشد، میتواند به خاطر آن خفه بشود. یا قلب و رشته اعصابِ مي توانند اسيب ببينند.

سیاه سرفه اگر فرزند شما به سیاه سرفه مبتلا باشد سرفههای زیاد و سختی خواهد کرد. سیاه سرفه در هلند زیاد وجود دارد. این بیماری به ویژه برای نوزادانِ خطرناک است. آنان میتوانند دچار اسیب مُغزَی بشُوند که هرگز درمان نخواهد شد. حتی به دلیل این بیماری کودکان می میرند. کودکی که واکسن علیه سیاه سرفه گرفته، می تواند به آن مبتلاً بشود، اما بیماری او نسبت به کودکی که واکسن دریافت نكرده بسيار سبكتر خواهد بود.

کزاز اگر فرزند شما دچار کزار بشود، عضلات او میتوانند منقبض بشوِند. حتى عضلاتي كه فرزند شما براي تنفسِ وِ بلعيدن غذا استفاده

می کُند منقبض خواهند شد. در این صورت کودک می تواند دجار خفگی بشود. کِودک از اثر گازگرفتن توسط پیک حیوان مثل خرگوش ىتواند كزّاز بگيرد. يا بر آثر وارد شدنَ آلودگى خيابان به درون زخم. فلج اطفال فلج اطِفال يا پوليو خلاصه كلمه پُوليوميليتيس يا همانٰ

فلج اطفال است. اگر فرزند شما به این بیماری مبتلا شود، می تواند

آنفلوآنزًا اگر فرزند شما به آلودگی باکتری هِموفیلوس آنقلوِآنزا (Hib) دچار شود می تواند تعدادی بیماری بگیرد: مننژیت (عفونت و التهابُ پرده مننژ)، عفونت و التهاب دریچه گلو، عفونت ریوی (ُذاتْ الْرِیهُ)، عفونُت و الُتهابُ مفاْصلُ، مُسمویتُ خونی. **هپاتیت ب** بیماری عفونی کبد است. گاهی این عفونت هرگز رفع نمی شود، در این صورت فرد حامل این ویروس خواهد بود. به خاطِر كبد دچار آسيب شديد شده و بعدها سرطان كبد به وجود خُولُهد آمدٌ. افرادْ به خاطر آن میمیرند. هپاتیت ب مسری است. دِیگرانِ هم می توانند آن را بگیرند. برای مثال از طریق تماس با خون آلوده. اگر کودک به این ویروس آلوده بشود، احتمال زیاد وجود دارد که حامل و ناقل این ویروس بشود. آیا شما باردار و حامل ویروس هپاتیت ب هستید؟ در این صورت کودک نوزاد شِما ظرف ۸۴

ساعت پس از تولّد واكسن أضافي دريافت خواهد كرد.

پنومونیه (سینه پهلو) فرزند شما با آلودگی به ویروس پنومونیه می تواند به تعدادی بیماری مبتلا بشود: مننژیت (عفونّت و التهاب پرده مننژ)، مسمومیت خونی، عفونت ریوی (ذات الریه)، برونشیت یا عفونت گوش میانی. در این صورت فرزند شما مِیتواند دچار اسیب همیشگی بشود، مثل ناشنوائی، صرع، عقب ماندگی ذهنی یا احتلال در رشد. به خاطر عفونت برخی اعضای بدن گاهی پزشک ناچار است دست یا پا را قطع کند. فرزند شما حتی به دلیل ابتلا به عفونت پنومونیه مى تواند بميرد. انواع مختلَّفى از پنومونيه وجود دارد. واكسّينه كردن کودک را در برابر مهم ترین انواع آین بیماری حفاظت خواهد کرد. **اوریون** بیماری غدد بزاقی است. می توانید ببینید که گونههای فرزندتان ورم می کند. فرزند شما می تواند از اوریون به منتزیت مبتلا بشود. فرزند شما به جز این میتواند دچار عفونت و التهاب در بیضه یا تخمدِان بشود. این می تواند به ندرِت سبب نازایی بشود.

سرخک وقتی فرزند شما به سرخک مبتلا باشد می تواند تب بالاو ضایعه پوستی (راش) داشته باشد. فرزند شما به این دلیل می تواند به بیماری سختی دچار شود. سرخک در فرزند شما می تواند به بیماریهای عفونت گوش، برونشیت، عفونت ریوی و مننژیت مَنجر شود. در شرایط جدی، کودک حتی میتواند از ابتلا به سرخکِ بمیرد.

سرخجه به ویژه در زمان باردآری خطرناک است. آیا دختر شما بعدها باردار شده و به سرخجه مبتلا می شود؟ در این صورت احتمال زیاد دارد که فرزند او ناقص به دنیا بیاید. برای مثال ناشنوا یا نابینا باشد. یا دچار اختلال قلبي يا عقب ماندِكي ذهني باشد. دختر شما به دليل سرخجه

ميتواند سقط جنين هم بكندٍ.

بیماری مننژیت نوع اس اگر فرزند شما به مننژیت نوع س مبتلا بشود می تواند دچار عَفُونت پرده مننژ مغز و مسمِومیت در خون بشود. فرزنّد شما مي تواند ناشنوا نيز بشود، عقب ماندگي ذهني، توإن اندک فراگیری و مشکلات رفتاری نیز از عواقب آن است. پزشک گاهی به الودگی اعضای بدن می تواند به ناچار دِست یا پا را قطع کند. سرطان دهآنهٔ رحم دختر شما به دلیل آلودگی به ویروس سرطانی دهانه رحم [HPV] بعدها دچار سرطان دهانهٔ رحم بشود. نام لاتین این ویروس (Humaan Papillomavirus) است. انواع گوناگونی از آن وجود دارد. واکسن افراد را در برابر مهمترین انواع این ویروس حفّاظت خواهد کرد.

واكسنها ميتوانند عوارض جانبي داشته باشند

فرزند شما مىتواند به چه عارضه جانبى مبتلا بشود؟

دستگاه ایمنی بدن یک کودک سالم و کودکان در سن بالاتر به خوبی می تواند درِ برابر واکسن مقاومت داشته باشد و دستگاه ایمنی بدن را می سازد. اگر فرزند شما واکسینه شده باشد، می تواند پس از آن حال خوبی نداشته باشد. همه کودکان در برابر واکسن واکنش مشابه ندارند. این ناراحتی ها اغلب پس از دریافت واکسن دیده می شوند:

- بهانه گیری و چسبیدن به بزرگسالان

- لُکُههای سرخ، ورم یا درد در جای واکسن. - مشکل به خاطر درد در حرکت دادن دست یا پایی که واکسن به آن

- خواب ناآرام در نوزادان یا زیاد خوابیدن.

- کودکان از کا سال به بالامی توانند به دلیل تنش عصبی از سر آمپول تزریق شده بیهوش بشوند.

بیشتر عوارض جانبی در روز تزریق واکسن شروع می شوند. اغلب پس از۲ ِروزرفع خَواهند شد. براثر واکسن اوریون، سرخک و سرخجه (سه

گانه) عوارض جانبی کمی دیرتر خود را نشان میدهند: ۵ تا ۲۱ روز پس نگران حال فرزندتان هستید؟ یا تب و بی تابی بهانه گیری بیش از ۲

روز طول کشیده است؟ با پزشک خانواده مشورت کنید. فرزند شما به دلیل دریافت واکسن ها بیشتر دچار بیماری شدیدتر نخواهد شد.

خود شما برای این عوارض جانبی چه می توانید بکنید؟ خود شما می توانید چند کار انجام دهید که مشکل عوارض جانبی

توجه، دلداری دادن و سرگرم کردن کودک برای کاستن از درد

 فرزند شما تب دارد؟ بگذارید تا تن کودک خنک بماند. لباس که به کودک بپوشانید، برای مثال تنها یک تن پوشِ یا پیراهن. کودک را در بستر کنار خودتان نگذارید. اینجا خیلی گرم است. بگذارید کودک در بستر خودش و زیر یک ملافه بخوابد. می توانید با دستمال مرطوب کودک را خنگ نگه دارید. لازم نیست به کودک

پاراستامول بدهید. اما توجه کنید که کودک به اندازه کافی بنوشد. • آیا فرزند شما استفراغ می کند؟ خوب او را زیر نظر داشته باشید (به ویژه نوزادان و کودکان خردسال را) روی شیکم خوابانیده و سرش را به پهلو بچرخانید. در اینصورت مواد بالاآمده وارد ریهها نخواهد شد. با همه احتمال استفراغ توصیه می شود که کودک را به پشت

ایا کودک از دست یا پای واکسن شده ناراحت است؟ تا حد ممکن

به آن دست نزنید. چون با دست زدن به آن درد تشدید خواهد شد.

ه هرگز کودک را تکان ندهید! حتی اگر حالت خفگی داشته باشد
و یا نفسش بالانیاید. اگر کودک را تکان بدهید می تواند به مغزش
آسبب برسد. بهتر است به گونه فرزندتان تلنگر زده و یا از پای او
نیشگون بگیرید.

 نگران فرزندتان هستید؟ فکر می کنید فرزندتان به دلیل واکسن خیلی بیمار است؟ یا اینِکه فرزند دچار عوارض ناشناخته شده آ است؟ با پزشک خانوادگی تماس بگیرید، یا به مطِب او مراجعه کنید. پزشک خانواده می تواند به شما توصیه هایی کرده و یا فرزندتان را معِاینه کند.

آیا فرزندتان زیاد گریه می کند؟ یا در روز دریافت واکسن درد زیاد دارد؟ می توانید به او پاراستامول بدهید. بهتر است این کار را زیاد نگنید. به میزان مصرف در توازن با سن و وزن کودک توجه داشته و آن را رعایت کنید. همیشه راهنمای مصرف دارو را بخوانید.

همیشه عوارض جانبی را اطلاع بدهید

آیا فرزند شما پس از دریافت واکسن دچار یکی از عوارض جانبی است؟ در دیدار بعدی از پزشک یا پرستاری که واکسن را تزریق کرده به او اطلاع بدهید. در این صورت از شرایط خاص فرزند شما اطلاع خواهد داشت. همه عوارض جانبي به خاطر واکسنها در هلند ثبت شده و مورد پژوهش قرار می گیرد. برای همین مهم است که عوارض جانبی

انستیتوی ملی بهداری و محیط زیست [RIVM] چه می کند؟ انستيتوي ملى بهداري و محيط زيست (RIVM) نظارت مي كند كه فرزند شما بتواند در برنامه واکسن ملی شرکت کند. انستیتوی ملّی بهداری و محیط زیست کارت واکسن بِرای شما ارسال می کند. این را خوب نگهداری کرده و وقتی برای واکسن دعوت شدید همراه داشته باشید. انسِتیتوی ملی بهداری و محیط زیست مشخصات فرزند شما را دارد و از آن تنها برای برنامه ملی واکسیناسیون استفاده میکند. در اینصورت اطلاع دارد که فرزند شماً چه واکسنهایی را در هلند دریافت کرده است.

براي واكسن به كجا بايد مراجعه كنيد؟

خدمات اجتماعی بهذاری [GGD] یا مرکز برای خانواده و نوجوان [CIG] وظیفه انجام واکسیناسیون را برعهده دارد. از سوی آنان برای دریافت واکسن دعوت خواهید شد.

> این راهنما از انتشارات: انستیتوی ملّی بهداری و محیط زیست (RIVM) است

نشانی: BA Bilthoven 3720 | Postbus 1 www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma www.facebook.com/rvp.vaccinaties

این اطلاعات با یاری خدمات اجتماعی بهداری [GGD] يديد امده است.

این بروشور توسط ارگان مرکزی اسکان پناهجویان (COA) ترجمه شده و حاوی اکاهی ویژه برای پناهجویان است. انستیتوی ملی بهداشت و محیط زیست (RIVM) با دقت ترجمه از زبان هلندی به فارسی را مورد بازبینی قرار داده است. انستیتوی ملی بهداشت و محیط زیست (RIVM) هیچ مسئولیتی در برابر خسارات احتمالی که حاصل از بیتوجهی احتمالی در ترجمه باشد، نخواهد داشت. متن به زبان هلندی در بروشور اعتبار دارد.

نوامبر ٢٠١٣